বাংলাদেশের কৃষি-প্রতিবেশগত অঞ্চল

কৃষি-প্রতিবেশগত অঞ্চল সাধারণ জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, ভূ-আচ্ছাদন এবং ভূমি ব্যবহারের উপযোগীতার উপরে নির্ভর করে ভাগ করা হয়। বাংলাদেশকে ৩০টি কৃষি-প্রতিবেশগত অঞ্চলে ভাগ করা হয়। এই অঞ্চলগুলো নিম্নরূপ:

অঞ্চল নং	শ্রেণী	মোট এলাকা (বর্গ কি:মি:)	মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য			
			ধরণ*	বালি (%)	পলি (%)	কাদা (%)
১	হিমালয় পাদদেশীয় পুরাতন সমভূমি (Old Himalyan Piedmont Plan)	৪,০০৮	১	১০	৮২	৮
২	সক্রিয় তিস্তা প্লাবনভূমি (Tista Active floodplain)	৮৩৬	২	৪১	৫৯	
৩	তিস্তা বাঁকে গঠিত প্লাবনভূমি (Tista Meander floodplain)	৯,৪৬৮	৩	৬	৮৮	৬
৪	করতোয়া-বাঙ্গালী প্লাবনভূমি (Korotoya-Bangali floodplain)	২,৫৭২	৩	৮	৬৫	
৫	নিম্ন আত্রাই বেসিন (Lower Atrai Basin)	৮৫১	৪	০	১৬	৮৪
৬	নিম্ন পূনর্ভবা প্লাবনভূমি (Lower Punarbhaba floodplain)	১২৯	৫	০	০	
৭	ব্রহ্মপুত্র-যমুনা সক্রিয় প্লাবনভূমি (Active Brahmaputra-Jamuna floodplain)	৩,১৯০	২	২৭	৭২	১
৮	ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নতুন প্লাবনভূমি (Young Brahmaputra-Jamuna floodplain)	৫,৯২৪	৩	৬	৭৯	
৯	পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের প্লাবনভূমি (Old Brahmaputra floodplain)	৭,২৩০	৪	২	৫১	৪৭
১০	সক্রিয় গাঙ্গেয় প্লাবনভূমি (Active Ganges floodplain)	৩,৩৩৪	৬	৮	৮০	
১১	গঙ্গা নদীর উজানের প্লাবনভূমি (High Ganges floodplain)	১৩,২০৫	৪	১	৫১	৪৮
১২	গঙ্গা নদীর ভাটির প্লাবনভূমি (Lower Ganges floodplain)	৭,৯৬৮	৪	০	৪৮	
১৩	গঙ্গার জোয়ারী প্লাবনভূমি (Ganges tidal floodplain)	১৭,০৬৬	৩	০	১৭	৮৩
১৪	গোপালগঞ্জ ও খুলনা বিল এলাকা (Gopalgonj-Khulna Beels)	২,২৪৭	৪	০	১৫	
১৫	আরিয়াল বিল (Arial Beel)	১৪৪	৪	০	৮	৯২
১৬	মেঘনা নদীর মাঝের অংশের প্লাবনভূমি (Middle Megna floodplain)	১,৫৫৫	৩	১৪	৫৯	
১৭	মেঘনা নদীর ভাটি অংশের প্লাবনভূমি (Lower Meghna floodplain)	৯০৯	৭	০	৫০	৫০
১৮	মেঘনা মোহনার নতুন গঠিত প্লাবনভূমি (Young Meghna Estuarine floodplain)	৯,২৬৯	৬	০	৯৮	
১৯	মেঘনা মোহনার পুরাতন প্লাবনভূমি (Old Meghna Estuarine floodplain)	৭,৭৪০	৩	০	৯০	১০
২০	সুরমা কুশিয়ারা পূর্বাংশের প্লাবনভূমি (Eastern Surma-Kusiara floodplain)	৪,৬২২	৩	১	২৫	
২১	সিলেট বেসিন (Sylhet Basin)	৪,৫৭৩	৩	১	১২	৮৭
২২	উত্তর ও পূর্বাংশের পাদদেশীয় প্লাবনভূমি (Northern & Eastern Piedmont Plains)	৪,০৩৮	৫	৪	৪	
২৩	চট্টগ্রামের উপকূলীয় সমভূমি (Chittagong Coastal Plain)	৩,৭২০	৩	৩	৮২	১৫
২৪	সেন্ট মার্টিন প্রবাল দ্বীপ (St. Martin Coral Island)	৮	৮	৯৬	২	
২৫	প্রায়-সমভূমি বরেন্দ্র চত্বর (Level Barind Tract)	৫,০৪৯	৯	০	৩	৯৭
২৬	উচ্চ বরেন্দ্রভূমি চত্বর (High Barind Tract)	১,৬০০	১০	০	১৩	
২৭	উত্তর-পূর্ব বরেন্দ্রভূমি (North-Eastern Barind Tract)	১,০৭৬	১০	০	২	৯৮
২৮	মধুপুর চত্বর (Madhupur Tract)	৪,২৪৪	৯	০	১৩	
২৯	উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ী এলাকা (North and Eastern Hills)	১৮,১৭১	১১	৯	৬৭	৪
৩০	আখাউড়া চত্বর (Akhaura Terrace)	১১৩	১২	০	৩১	

* **মৃত্তিকার ধরণ:** 1. Non-calcareous brown, 2. Non-calcareous alluvium, 3. Non-calcareous grey, 4. Non-calcareous dark grey, 5. Acid basin clays, 6. Calcareous alluvium, 7. Calcareous grey, 8. calcareous alluvium (non saline), 9. Shallow grey terrace, 10. Deep grey terrace, 11. Brown hill, 12. Deep red-brown terrace

উৎস: FAO,1988,Land Resources Appraisal of Bangladesh for Agricultural Development, Reoprt 2, Agroecological Regions of Bangladesh

তথ্যপত্রটি বাংলাদেশ সরকারের ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল কর্তৃক প্রকাশিত এবং সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ (সিএনআরএস) কর্তৃক প্রণীত ও মুদ্রিত

বাংলাদেশের কৃষি-প্রতিবেশগত অঞ্চল



UNDP Bangladesh · DFID Department for International Development · CDMP · Climate Change Cell · CNRS